

**CAMPANIE DE PREVENȚIE A
CANCERULUI DE COL UTERIN
- IANUARIE 2024 -**

**“INFORMEAZĂ-TE!
TESTEAZĂ-TE
VACCINEAZĂ-TE”**

**PROIECT DE PLANIFICARE ASUPRA
CAMPANIEI NAȚIONALE**



MINISTERUL
SĂNĂȚĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică





Strategia Globala pentru eliminarea cancerului de col uterin

lansată în 17 noiembrie 2020 de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
printr-o rezoluție adoptată de 194 de țări.

OBIECTIVUL STRATEGIEI: Până în anul 2030 incidența cancerului de col uterin să scadă și să se mențină la sub 4 cazuri noi la 100.000 de femei.

Atingerea obiectivului ar fi posibilă dacă sunt îndeplinite 3 ținte esențiale:

▪ 90% din fetițe să fie vaccinate împotriva HPV până la împlinirea vârstei de 15 ani



▪ 70% din femeile adulte să fie testate cu un test de înaltă performanță de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani



▪ 90% din femeile cu teste pozitive să beneficieze de tratament al leziunilor pre-canceroase și al celor maligne






Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită prin vaccinare și screening și poate fi vindecată dacă este depistată la timp și tratată corespunzător.





CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN- IANUARIE 2024

La nivel mondial, cancerul de col uterin este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer ce poate apărea în rândul femeilor, cu peste 600.000 cazuri noi diagnosticate în 2020 (6.5% din toate cancerurile) și a patra cauză de deces dintre toate cauzele în rândul femeilor (7,5% - 341 831 decese)




Incidența și mortalitatea standardizată prin cancer de col uterin, pe localizări, la nivel mondial, 2020, femei de toate vârstele, Rata standardizată în funcție de vârstă GLOBOCAN 2020, available at <http://gco.iarc.fr/today> Accesat la data de: Noiembrie 2023



CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN- IANUARIE 2024

Incidența cancerului de col uterin și ratele mortalității au scăzut în multe țări UE, cancerul col uterin ocupând locul 11 printre cele mai frecvente cancere la femei și pe locul 12 printre cele mai frecvente cauze de deces prin cancer.

În România cancerul de col uterin este al treilea ca frecvență (după cancerul de sân și cancerul colorectal), situație care diferă de profilul european, unde cancerul de col uterin nu se mai regăsește în principalele 5 localizări ale cancerului la femei.




RATA STANDARDIZATĂ ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ (TOATE TIPURILE DE CANCER) - ROMÂNIA – FEMEI 404 la 100 000 de locuitori ; UE – FEMEI - 484 la 100 000 de locuitori (Notă: Cancerul de col uterin nu este inclus în cancerul de corp uterin. Aceste estimări au fost produse înainte de pandemia de COVID-19, pe baza tendințelor de incidență din anii precedenți, și pot diferi de ratele observate în anii mai recenti. Sursă: Sistemul european de informații cu privire la cancer (ECIS), <https://ecis.jrc.ec.europa.eu>, accesat la 9.5.2022. © Uniunea Europeană, 2022)



INFECȚIA CU VIRUSUL PAPILOMA UMAN (HPV)

- Peste 90% din cazuri de cancer de col uterin cauzate de infecția cu HPV
- HPV se transmite în special prin contact sexual
- 8 persoane din 10 se infectează cu HPV în cursul vieții
- În majoritatea cazurilor infecția se vindecă de la sine
- Uneori, infecția HPV persistă și poate produce leziuni, veruci (condiloame) genitale sau leziuni precanceroase.
- Tipurile de HPV care produc veruci sunt diferite de tipurile de HPV care pot produce cancer.
- Între infecția cu HPV și apariția cancerului de col uterin pot trece mulți ani (chiar zeci).
- Infecția cu HPV nu prezintă simptome





VACCINAREA anti – HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin

- Vaccinul antiHPV oferă protecție împotriva formelor invazive de cancer cauzate de HPV.
- Riscul de infecție este la fel de mare în cazul fetelor și al băieților.
- Momentul optim pentru vaccinare înaintea debutului activității sexuale (înaintea apariției riscului de infecție HPV)

În România, vaccinarea anti HPV:

- ❖ este gratuită pentru fete și băieți între 11 ani și 19 ani
- ❖ este compensată 50% pentru femei între 19 ani și 45 de ani



SCREENING-UL pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

Screeningul reprezintă testarea periodică, la intervale regulate, a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (25 – 64 ani), pentru a depista dacă au leziuni precanceroase;

Dacă apar leziuni precanceroase, acestea pot fi tratate și nu vor mai evolua, prevenind astfel apariția cancerului de col uterin!

Recomandările europene pentru screening:


- Testare Babeș Papanicolaou la femei între 25-29 ani
- Testare HPV la femei între 30- 64 ani
- Testare efectuată o dată la fiecare 5 ani





CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN- IANUARIE 2024

Procentul femeilor în vârstă de peste 20 ani care au beneficiat de un test de screening pentru cancerul de col uterin a fost de 39%, față de media U.E 54% (2019-2020).



Femei 20-69 ani testate in ultimii 2 ani. Media EU neponderata. Linia 90% reflecta tinta UE pentru 2025.

Source: OECD Health Statistics 2022 and Eurostat database



OMS - Putem elimina cancerul de col uterin!

**WE CAN END
CERVICAL CANCER**

Get Informed.
Find out the facts about cervical cancer and the human papillomavirus (HPV) that causes it. Help educate other women in your life too.

Get Screened.
Cervical cancer screening typically starts at age 30 and is repeated periodically.

Get Vaccinated.
The HPV vaccine is given in 2 doses that should begin when a girl is between 9 and 14 years old.

 World Health Organization



REZULTATELE* EVALUĂRII CUNOȘTIINȚELOR, ATITUDINILOR ȘI PERCEPȚIILOR CU PRIVIRE LA SCREENING-UL CANCERULUI DE COL UTERIN, N=1605**

- Peste 96% dintre respondente au auzit de cancerul de col uterin (CCU)
- 7% dintre femeile care au auzit de cancerul de col uterin au menționat ”infecția cu HPV” ca factor etiologic
- 91% dintre femei au auzit despre testul Babeș-Papanicolau
- 2% dintre femei știu că testul screening trebuie efectuat la 5 ani
- Respondentele care au declarat că nu au făcut testul BabeșPapanicolaou, menționează ca motive : nu au avut simptome (34%), nu au știut că e necesar (11 %), nu au avut timp (9%), din neglijență/ezitare (7%), sunt sănătoase așa că nu au nevoie (7%), nu au avut bani (6%), teama de rezultat - să afle că au cancer (6%)
- 25% dintre femei au auzit de virusul papiloma uman (HPV)
- 50% dintre femeile care au auzit de virusul au auzit și despre existența vaccinului anti-HPV
- 75% dintre persoanele chestionate și care au auzit despre vaccinul anti HPV spun că ar fi de acord cu vaccinarea fiicei lor în vârstă de 11-14 ani.

*Rezultate obținute în studiul realizat în anul 2020 de către Institutul Oncologic "Prof Dr. Ion Chiricuță" Cluj- Napoca și Institutul Național de Sănătate Publică în cadrul proiectului " Integrearea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin ", finanțat de către Fondul Social European și Ministerul Sănătății, prin Programul Operațional Capital Uman, contract POCU/257/4//9/120798.

** Număr de respondenți



TEMA CAMPANIEI

Prevenția cancerului de col uterin prin promovarea vaccinării antiHPV și a screening-ului pentru depistarea leziunilor precanceroase.



PERIOADA DE DERULARE A CAMPANIEI

IANUARIE 2024



SLOGANUL CAMPANIEI

“INFORMEAZĂ-TE , TESTEAZĂ-TE , VACCINEAZĂ-TE” !



MESAJELE PRINCIPALE

1. Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită prin vaccinare și screening și poate fi vindecată dacă este depistată la timp și tratată corespunzător.
2. Vaccinarea anti HPV este recomandată atât fetelor cât și băieților cu vârsta cuprinsă între 11 și 19 ani.
3. Femeilor cu vârsta între 25 și 64 de ani li se recomandă participarea la programele de screening pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin.